

**Prospect: Informații pentru pacient**

**FERVEX “pentru adulți” cu aromă de zmeură 500mg/200mg/25mg granule pentru soluție orală**  
Paracetamol/ acid ascorbic/ maleat de feniramină

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**Ce găsiți în acest prospect**

1. Ce este Fervex “pentru adulți” cu aromă de zmeură și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Fervex “pentru adulți” cu aromă de zmeură
3. Cum să utilizați Fervex “pentru adulți” cu aromă de zmeură
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Fervex “pentru adulți” cu aromă de zmeură
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Fervex “pentru adulți” cu aromă de zmeură și pentru ce se utilizează**

Tratamentul simptomatic al răcelilor comune, rinitelor alergice și vasomotorii, stărilor gripale (pentru ameliorarea strănutului, secreției nazale apoase, inflamației mucoaselor nazală și sinusală, febrei, durerilor de cap și musculare).

Tratamentul cu antibiotice poate fi necesar în cazul apariției infecțiilor bacteriene.

**2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Fervex “pentru adulți” cu aromă de zmeură**

**Nu utilizați Fervex “pentru adulți” cu aromă de zmeură:**

- dacă sunteți alergic la paracetamol, fenacetină sau alte antiinflamatoare, feniramină sau alte antihistaminice sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la pct. 6).

Dacă aveți un deficit de glucozo-6-fosfat-dehidrogenază.

Dacă suferiți de insuficiență renală severă (riscul de efecte nedorite renale poate fi crescut în cazul administrării prelungite de doze mari).

Dacă aveți tulburări uretro-prostatice cu risc de retenție urinară.

Dacă suferiți de glaucom cu unghi închis sau predispoziție la glaucom cu unghi închis; glaucom cu unghi deschis.

Dacă suferiți de insuficiență hepatocelulară.

Dacă sunteți în tratament concomitent cu inhibitori de monoaminooxidază (MAO) non-selective.  
Dacă suferiți de litiază renală oxalocalcică (doze mari – 1 g acid ascorbic pe zi, timp îndelungat).  
Dacă aveți vârsta sub 15 ani.

### **Atenționări și precauții**

Nu depășiți dozele indicate și consultați medicul dacă acest lucru s-a întâmplat accidental.  
Dacă apar reacții alergice, tratamentul va fi întrerupt imediat.  
Nu folosiți Fervex “pentru adulți” cu aromă de zmeură dacă suferiți de boli ale rinichilor, fără recomandarea medicului.  
Este necesară prudență în cazul administrării la vârstnici.  
Nu lăsați Fervex “pentru adulți” cu aromă de zmeură la vederea și îndemâna copiilor.

Vă rugăm să întrebați medicul dumneavoastră dacă sunteți sau ați fost în una dintre aceste situații.

### **Fervex “pentru adulți” cu aromă de zmeură împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu luați Fervex “pentru adulți” cu aromă de zmeură împreună cu alte medicamente (de exemplu, barbiturice, carbamazepină, hidantoină, rifampicină, sulfonpirazonă, contraceptive estro-progestative, antifungice, doxorubicină, izoniazidă, mercaptopurină, metotrexat, săruri de aur, barbiturice, primidonă, anticoagulante cumarinice, antiinflamatoare nesteroidiene, ciclosporină, agoniști morfinici, antiacide, cărbune activat, anticolinergice, fenicoli, sultopridă, MAO, deprimante ale SNC, atropină, fenitoină, deferoxamină) fără să vă consultați medicul sau farmacistul.

Pentru a evita potențiale interacțiuni între diferitele medicamente, trebuie ca dumneavoastră să informați precis medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă ați luat sau luați și alte medicamente.

### **Fervex “pentru adulți” cu aromă de zmeură împreună cu alimente, băuturi și alcool**

Nu consumați alcool, medicamente sau alimente ce conțin alcool în timpul tratamentului cu *Fervex* “pentru adulți” cu aromă de zmeură.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

#### **Sarcina**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.  
Datorită absenței studiilor pe animale și la om, riscul este necunoscut. În consecință, ca o măsură de precauție, acest medicament nu trebuie administrat în timpul sarcinii sau în perioada de alăptare.

#### **Alăptarea**

Întrebați medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a utiliza orice medicament în timpul alăptării.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Datorită efectelor adverse pe care le are (de exemplu somnolență, sedare, stare confuzională, amețeală, tulburări de acomodare a vederii, etc.), medicamentul poate influența capacitatea de a conduce autovehicule sau de a folosi utilaje.

**Fervex “pentru adulți” cu aromă de zmeură conține 11,555 g de zahăr pe plic**, cantitate ce trebuie luată în calcul la consumul zilnic. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienții cu diabet zaharat.  
Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Conține un agent colorant azoic - galben amurg FCF (E110) care poate provoca reacții alergice.

### **3. Cum să utilizați Fervex “pentru adulți” cu aromă de zmeură**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală. Discutați cu medicul dumneavoastră, farmacistul sau cu asistenta medicală dacă nu sunteți sigur.

**Adulți și adolescenți cu vârsta peste 15 ani:** 1 plic Fervex “pentru adulți” cu aromă de zmeură de 2-3 ori pe zi. Intervalul între administrări trebuie să fie de cel puțin 4 ore.

Dacă suferiți de insuficiență renală severă (clearance-ul creatininei <10 ml/min), intervalul între administrări trebuie să fie de cel puțin 8 ore.

Plicurile se administrează cu o cantitate suficientă de apă rece sau fierbinte.

Pentru tratamentul stărilor gripale, este preferabilă administrarea acestui medicament cu apă fierbinte, seara, din momentul apariției primelor simptome.

Informați medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă starea de rău continuă și după 5 zile de tratament. Medicul dumneavoastră vă va informa cât va dura tratamentul cu Fervex “pentru adulți” cu aromă de zmeură.

Dacă aveți impresia că efectul lui Fervex “pentru adulți” cu aromă de zmeură este prea puternic sau prea slab întrebați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

#### **Dacă utilizați mai mult Fervex “pentru adulți” cu aromă de zmeură decât trebuie**

Dacă ați utilizat mai mult Fervex “pentru adulți” cu aromă de zmeură decât trebuie, anunțați imediat medicul dumneavoastră sau farmacistul.

#### **Dacă uitați să utilizați Fervex “pentru adulți” cu aromă de zmeură**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza pe care ați uitat să o luați.

Luați doza următoare când vă amintiți și continuați tratamentul.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.

### **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

- Sedare, somnolență, uscăciunea gurii, tulburări urinare, tulburări de acomodare a vederii (la distanță), stare confuzională, agitație la pacienții vârstnici, tensiune arterială scăzută la poziția “stat în picioare”, amețală, scăderea memoriei și capacității de concentrare.

- Rare cazuri de trombocitopenie (scăderea sub nivel normal a unor elemente sanguine-plachete, care au rol în procesul de coagulare a sângelui manifestată prin sângerări neobișnuite și apariția de hematoame), anemie hemolitică (scăderea sub nivel normal a unor elemente sanguine - hematii, manifestată prin stare de oboseală și slăbiciune neobișnuite), agranulocitoză (manifestată prin febră cu sau fără frisoane, ulceratii sau pete de culoare albă la nivelul buzelor sau mucoasei bucale, ulceratii la nivelul faringelui);

- În cazuri mai rare, mâncărime la nivelul pielii, roșeața pielii, urticarie, trebuie oprit tratamentul și anunțat medicul.

#### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale  
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1  
București 011478- RO  
Tel: + 4 0757 117 259  
Fax: +4 0213 163 497  
e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

## 5. Cum se păstrează Fervex “pentru adulți” cu aromă de zmeură

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## 6. Conținutul ambalajului și alte informații

### Ce conține Fervex “pentru adulți” cu aromă de zmeură

- Substanțele active sunt paracetamol, acid ascorbic și maleat de feniramină. Fiecare plic cu granule pentru soluție orală conține paracetamol 500 mg, acid ascorbic 200 mg și maleat de feniramină 25 mg.
- Celelalte componente sunt: sucroză (zahăr), acid citric anhidru, gumă arabică, zaharină sodică, Aroma de zmeură\* (care conține colorant galben amurg FCF (E110)) (Raspberry flavour 501481 TP 0804) care conține: arome, coloranți, maltodextrină, amidon de porumb modificat (E 1450).

### Cum arată Fervex “pentru adulți” cu aromă de zmeură și conținutul ambalajului

Se prezintă sub formă de pulbere granulată de culoare slab roz până la slab bej.

După dizolvarea conținutului unui plic într-o cantitate suficientă de apă rece sau fierbinte, rezultă o soluție ușor opalescentă, având culoarea roz.

Este disponibil în cutii cu 6 plicuri din hârtie/Al/PE a câte 12,75 g granule pentru soluție orală și cutii cu 8 plicuri din hârtie/Al/PE a câte 12,75 g granule pentru soluție orală.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

### Deținător al autorizației de punere pe piață

UPSA SAS

3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison,  
Franța.

### Fabricanții

UPSA SAS

979 avenue des Pyrénées, 47520 Le Passage, Franța

UPSA SAS

304 avenue du Docteur Jean Bru, 47000 Agen, Franța

Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață:

**Acest prospect a fost revizuit în februarie 2019.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>