

Prospect: Informații pentru utilizator**EUCARBON comprimate**

Pulbere de frunze de Senna, extract uscat de rubarb, cărbune vegetal (neactivat), sulf purificat

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Eucarbon și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Eucarbon
3. Cum să utilizați Eucarbon
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Eucarbon
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Eucarbon și pentru ce se utilizează

Acest medicament este utilizat în tratamentul constipației.

Substanțele active conținute de Eucarbon sunt exclusiv de origine vegetală și minerală și au rol de reglare a digestiei, cu un ușor efect laxativ. Cărbunele vegetal (neactivat) are capacitatea de a adsorbi diferite substanțe metabolice toxice care, ulterior, sunt excretate datorită efectului laxativ al pulberii de frunze de Senna și al extractului uscat de rubarb. Sulful purificat are, de asemenea, un efect ușor dezinfectant în tractul intestinal.

Efectul ușor laxativ al acestui medicament se instalează la aproximativ 8-10 ore după administrare.

Dacă după câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Eucarbon**Nu utilizați Eucarbon:**

- dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6);
- dacă aveți ocluzie/subocluzie intestinală – blocarea totală /parțială a tranzitului intestinal;
- dacă aveți cancer al colonului sau rectului;
- dacă aveți sângerări la nivelul intestinului gros de cauză necunoscută;
- dacă aveți inflamații intestinale;
- dacă aveți dureri abdominale de cauză neidentificată;

- dacă aveți tulburări severe ale echilibrului hidrolitic și mineral;
- dacă sunteți suspect de ulcer gastric sau duodenal;
- la copii cu vârsta mai mică de 10 ani;
- în perioada sarcinii și alăptării.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Eucarbon, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Aveți grijă:

- dacă simptomele nu se îmbunătățesc sau dacă tratamentul nu are rezultate. În funcție de situație, trebuie să-l consultați imediat pe medicul dumneavoastră.
- dacă ați putea fi gravidă. Informați-l imediat pe medicul dumneavoastră dacă sunteți gravidă.
- doza necesară pentru obținerea unui efect sigur poate varia individual. Nu utilizați Eucarbon pentru o perioadă mai lungă de timp (peste 1-2 săptămâni) fără recomandarea medicului dumneavoastră.
- Eucarbon nu este recomandat ca tratament în curele de slăbire.
- când utilizați acest produs o perioadă lungă de timp, mai mult de 14 zile, eficacitatea se poate diminua.

Pacienții imobilizați la pat perioade prelungite vor efectua un control înaintea inițierii tratamentului cu Eucarbon.

Copii

Copiii vor primi tratament cu laxative numai în situații excepționale și numai la recomandarea expresă a medicului.

Eucarbon împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Dacă utilizați tratamente pentru inimă:

În cazul unei hipokaliemii ridicate (lipsă de kaliu/potasiu), efectul anumitor medicamente folosite în tratamentul unor boli de inimă (glicozide cardiace) poate fi crescut.

Spuneți medicului dumneavoastră înaintea începerii tratamentului cu Eucarbon dacă luați unul dintre următoarele medicamente:

- amiodaronă,
- astemizol,
- bepridil,
- bretilium,
- disopiramidă,
- eritromicină administrată intravenos,
- halofantrină,
- pentamidină,
- chinidină,
- sparfloxacină,
- sotalol,
- sultopridă,
- terfenadină,
- vincamină.

Acestea pot produce modificări ale activității electrice a inimii – torsada vârfulor, care pot fi accentuate de administrarea Eucarbon.

Următoarele medicamente produc o scădere a nivelului de potasiu din sânge și administrarea concomitentă cu Eucarbon necesită monitorizarea nivelului de potasiu din sânge:

- diuretice – pentru eliminarea apei în exces din organism,
- amfotericină B administrată intravenos – pentru tratamentul anumitor infecții,
- corticoizi – folosiți pentru tratamentul inflamațiilor severe,
- tetracosactidă – folosită pentru testarea activității unor glande endocrine.

Eucarbon împreună cu alimente și băuturi

Eucarbon poate fi administrat în timpul mesei sau după masă.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Eucarbon nu trebuie utilizat pe perioada sarcinii și alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Eucarbon nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizați Eucarbon

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată este:

Adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani

Dacă medicul dumneavoastră nu v-a prescris altfel, doza uzuală pentru a obține un efect ușor laxativ și pentru a reduce flatulența este de 1-2 comprimate administrate de 1-3 ori pe zi în timpul mesei sau după masă.

Dozajul necesar pentru a obține efectul dorit poate varia individual. Dacă se dorește un efect laxativ mai puternic, doza de seară poate fi crescută la 3 – 4 comprimate Eucarbon.

Doza maximă zilnică de 8 comprimate nu trebuie depășită.

Eucarbon comprimate se administrează cu o cantitate mare de lichide (cel puțin un pahar cu apă).

Dacă utilizați mai mult Eucarbon decât trebuie

Apariția diareei este un semn de supradozaj. În acest caz, tratamentul se întrerupe sau se reduce doza de Eucarbon.

Dacă uitați să utilizați Eucarbon

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Rare (pot afecta mai puțin de 1 din 1000 persoane)

- greață sau vărsături – pot fi semne ale supradozajului.

Foarte rare (pot afecta mai puțin de 1 din 10000 persoane)

- dureri abdominale,
- diaree.

Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

- colorație anormală a urinei.

Administrarea de doze mai mari pe o perioadă mai lungă de timp poate determina pierderea sărurilor minerale, în special a potasiului, care duce la slăbirea musculaturii și intensificarea constipației datorită activității scăzute a colonului.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe website-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Eucarbon

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Eucarbon

- Substanțele active sunt: pulbere de frunze de Senna 105 mg, extract uscat de rubarb 25 mg, cărbune vegetal (neactivat) 180 mg, sulf purificat 50 mg.
- Celelalte componente sunt: ulei de mentă, ulei de fenicul, zaharoză, amidon de porumb, talc, kaolin greu, gumă acacia.

Cum arată Eucarbon și conținutul ambalajului

Comprimate de culoare gri până la negru, fără linie de divizare.

Cutie cu un blister Al/PVDC-PVC cu 10 comprimate

Cutie cu 3 blistere Al/PVDC-PVC a câte 10 comprimate

Cutie cu 5 blistere Al/PVDC-PVC a câte 10 comprimate

Cutie cu 10 blistere Al/PVDC-PVC a câte 10 comprimate

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

F.TRENKA Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Ges.m.b.H.
Prinz-Eugen-Straße 70, 1040 Viena, Austria

Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață:

Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL
B-dul Metalurgiei, nr. 78
sect. 4, 041836, Bucuresti
Tel: +40 21 321 16 40
Fax: +40 21 321 16 40

email: office@remedia.ro

Acest prospect a fost revizuit în Decembrie, 2020.