

Prospect: Informații pentru utilizator**STREPSILS ORANGE VITAMINA C pastile**

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect, înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece el conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Strepsils Orange Vitamina C și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Strepsils Orange Vitamina C
3. Cum să utilizați Strepsils Orange Vitamina C
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Strepsils Orange Vitamina C
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Strepsils Orange Vitamina C și pentru ce se utilizează

Strepsils Orange Vitamina C aparține unei grupe de medicamente denumite antiseptice.

Strepsils Orange Vitamina C este indicat pentru tratamentul durerilor în gât, favorizând ameliorarea simptomelor.

Strepsils Orange Vitamina C asigură cantitatea de Vitamina C necesară în cursul infecțiilor oro-faringiene. Efect antibacterian, antifungic și antiviral

Calmare rapidă (în 5 minute) și de lungă durată (de până la 2 ore) a durerii puternice în gât.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Strepsils Orange Vitamina C**Nu luați Strepsils Orange Vitamina C**

- dacă sunteți alergic la amilmetacrezol, alcool 2,4-diclorobenzilic, acid ascorbic și ascorbat de sodiu sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6).

Atenționări și precauții

Înainte să luați Strepsils Orange Vitamina C, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului:

- dacă aveți diabet zaharat.

Strepsils Orange Vitamina C împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu se cunosc interacțiuni cu alte medicamente.

Utilizarea Strepsils Orange Vitamina C cu alimente, băuturi și alcool

Strepsils Orange Vitamina C nu se administrează concomitent cu alimente sau băuturi. A se administra între mese.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Strepsils Orange Vitamina C nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Strepsils Orange Vitamina C conține glucoză și zahăr. Dacă medicul v-a atenționat că aveți o intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

O pastilă Strepsils Orange Vitamina C conține glucoză 968,491 mg și zahăr 1 437,900 mg. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienții cu diabet zaharat.

Pastilele Strepsils Orange Vitamina C conțin colorant galben amurg FCF (E 110) și colorant roșu coșenilă A (E 124) care pot determina reacții alergice.

3. Cum să utilizați Strepsils Orange Vitamina C

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doze

Reacțiile adverse pot fi minimizate prin utilizarea celei mai mici doze eficiente necesare pentru a controla simptomele, pentru cea mai scurtă durată posibilă.

Durata tratamentului nu trebuie să depășească 5 zile, deoarece pot apărea dezechilibre ale florei microbiene de la nivelul cavității bucale cu risc de producere a unor infecții bacteriene sau fungice.

Adulți

Doza recomandată este de o pastilă Strepsils Orange Vitamina C la fiecare 2 ore; Nu depășiți doza recomandată (cel mult 8 pastile în 24 ore).

Populația pediatrică

Copii cu vârsta peste 6 ani: doza recomandată este similară cu cea pentru adulți.

Copii cu vârsta sub 6 ani

Nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 6 ani.

Vârstnici

Nu este necesară ajustarea dozei la această categorie de pacienți.

Mod de administrare

Pentru administrare bucofaringiană.

Pastilele se țin în cavitatea bucală până la dizolvare; nu se mestecă și nu se înghit întregi; se administrează între mese. La fel ca în cazul altor pastile, pentru a evita riscul apariției iritațiilor locale, trebuie să schimbați poziția pastilei în gură până la dizolvare.

Pentru a evita pericolul de sufocare, Strepsils Orange Vitamina C va fi administrat numai copiilor care pot păstra pastila în gură până când aceasta se dizolvă lent, fără a fi supravegheați.

Dacă utilizați mai mult decât trebuie din Strepsils Orange Vitamina C

Poate apare disconfort gastro-intestinal; se întrerupe tratamentul și se iau măsurile de tratament simptomatic – pentru aceasta adresați-vă medicului dumneavoastră sau departamentului de primire urgențe.

Dacă uitați să utilizați Strepsils Orange Vitamina C

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Strepsils Orange Vitamina C

Întreruperea prematură a tratamentului nu vă afectează.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile)

- reacții de hipersensibilitate,
- greață,
- senzație de disconfort la nivelul gurii,
- diaree,
- erupții pe piele.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Strepsils Orange Vitamina C

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații**Ce conține Strepsils Orange Vitamina C**

- Substanțele active sunt amilmetacrezol 0,6 mg, alcool 2,4-diclorobenzilic 1,2 mg, acid ascorbic 33,5 mg și ascorbat de sodiu 74,9 mg.
- Celelalte componente sunt acid tartric, blood orange PHL 105288, propilenglicol, levomentol, galben amurg FCF (E 110) și roșu coșenilă A (E 124), zahăr, glucoză.

Cum arată Strepsils Orange Vitamina C și conținutul ambalajului

Strepsils Orange Vitamina C se prezintă sub formă de pastile rotunde, de culoare portocalie, cu miros caracteristic și gust dulce-acrișor, cu logo Strepsils inscripționat pe ambele fețe.

Este disponibil în cutii cu blister sau cu **2 blistere** din Al/PVC-PVDC a câte 12 pastile.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricanții

Deținătorul autorizației de punere pe piață

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL
Str. Grigore Alexandrescu, nr. 89-97, Corpul A
Etaj 5, sector 1, București, România

Fabricanții

Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Thane Road, Nottingham NG90 2DB, Marea Britanie

RB NL Brands B.V.
Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Olanda

Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață:

Reckitt Benckiser România SRL
Bd. Dacia 99, Et. 3, Sect. 2, București, România
Tel: +4021 529 67 00

Acest prospect a fost revizuit în Octombrie, 2019.